

胚細胞腫瘍

1	VP (ETOP+IFM+DDP)
2	胚細胞腫瘍：EP
3	胚細胞腫瘍：BEP


化学療法計画書

治療法名	VIP (ETOP+IFM+CDDP)		
コース数		コース目	
腫瘍種	胚細胞腫瘍		
患者名		♂	年齢
患者ID		生年月日	
部署		主治医	科 Dr

開始予定日

治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29
	予定日	1/0							1/7		1/14		1/21		1/28
エトポシド 100 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓
シスプラチン 20 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓
イホマイド 1200 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓
グラニセトロン 1mg		↓	↓	↓	↓	↓									
デキサート 9.9mg		↓	↓	↓	↓	↓									
ウロミテキサン 300 mg/m ² x3		↓	↓	↓	↓	↓									
アプレピタント 125mg		↓	↓	↓	↓	↓									
アプレピタント 80mg		↓	↓	↓	↓	↓									
デカドロン 8mg							↓	↓							
治療開始日									治療間隔	3~4週毎	予定コース数				コース
身長	150	cm	体重	50	kg	BSA	1.40		m ²						
eGFR	60	mL/min	eGFR/BSA	49		mL/min									

投与開始基準
・ WBC>3000, 好中球>1,500, Plt>100,000
・ AST/ALT<100, T-Bil<1.5
・ Cr<1.2, CCr>60 (<<30で75%量)
・ G2以上の非血液毒性なし
減量基準
・ WBC<1,000, Plt<25,000
・ 発熱性好中球減少
・ G3の非血液毒性



day2~5のアプレピタントは朝食後
デカドロンはDay6の朝より2日間


day1から5日間体重測定 (AM) → 1kg増えたら利尿薬考慮 (医師に相談)

化学療法計画書

治療法名		胚細胞腫瘍：EP									
コース数		1	コース目								
治療法コード											
患者名	名前を入力				性別	年齢					
患者ID	IDを入力		生年月日								
部署	指示部署を入力		主治医	科	Dr						
開始予定日											
治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	9	16	22
	予定日	1/0			1/8			1/15			1/21
シスプラチン	20 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓					↓
エトポシド	100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓					↓
グラニセトロン	1mg	↓	↓	↓	↓	↓					↓
デキサート	6.6mg	↓	↓	↓	↓	↓					↓
アプレピタント	125mg			↓							↓
アプレピタント	80mg			↓	↓	↓	↓				↓
治療開始日		治療間隔		3週毎	予定コース数	コース					
身長	150 cm	体重	50 kg	BSA	1.40 m ²						
eGFR	60 mL/min	eGFR/BSA	49 mL/min								

Day 1-5

投与可否の基準	
<ul style="list-style-type: none"> ・ WBC > 3,000, かつ好中球 > 1,500 ・ Plt > 100,000 ・ 発熱なし ・ AST/ALT ≤ 100, T. Bil ≤ 1.5 (T-Bil : 1.5-3 : ETOP50%量) ・ Cr ≤ 1.2 ・ PS 0-2 	
減量基準	
<ul style="list-style-type: none"> ・ G-CSFを使用して治療スケジュールを順守する。 ・ 肝障害、腎障害時、減量考慮 	



化学療法計画書

治療法名	胚細胞腫瘍：BEP		
コース数	1	コース目	
治療法コード			
患者名		性別	年齢
患者ID		生年月日	
部署		主治医	科 Dr

開始予定日

治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	9	16	22
シスプラチン 20 mg/m ²	予定日	1/0							1/8	1/15	1/21
エトポシド 100 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓					↓
ブレオ 30 mg						↓				↓	↓
グラニセトロン 1mg		↓	↓	↓	↓	↓					↓
デキサート 6.6mg		↓	↓	↓	↓	↓		↓		↓	↓
アプレピタント 125mg				↓							↓
アプレピタント 80mg						↓	↓	↓			↓
治療開始日					治療間隔			3週毎	予定コース数	コース	
身長	150	cm	体重	50	kg	BSA	1.40	m ²			
eGFR	60	mL/min	eGFR/BSA	49	mL/min						

Day 1-5

Day 9, 16

投与可否の基準
・ WBC>3,000, かつ好中球>1,500
・ Plt>100,000
・ 発熱なし
・ AST/ALT≤100, T. Bil≤1.5 (T-Bil : 1.5-3⇒ETOP50%量)
・ Cr≤1.2
・ PS 0-2
減量基準
・ G-CSFを使用して治療スケジュールを順守する。
・ 肝障害、腎障害時、減量考慮

