

# 化学療法計画書

治療法名	BEV維持療法15mg/kg															
コース数	1	コース目														
腫瘍種	非小細胞肺がん 悪性神経膠腫															
患者名		♂	年齢													
患者ID		生年月日														
部署		主治医														
治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29	...
	予定日	1/0							1/7				1/14		1/21	1/28
ベバシズマブ	15 mg/kg	↓														
治療開始日	2001年8月1日		治療間隔	3週毎	予定コース数	PDまで コース										
身長	160	cm	体重	50	kg	BSA	1.46 m <sup>2</sup>									

開始予定日

投与開始基準	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CBDCA+PEM+Bev 4 コース後</li> <li>・ PS : 0-1</li> <li>・ 好中球 <math>\geq 1500</math>    ・ <math>\text{Plt} \geq 75,000</math></li> <li>・ T-Bil <math>\leq 2.0</math>    ・ AST/ALT <math>\leq 100</math></li> <li>・ Cr <math>\leq 1.2</math></li> <li>・ 38°C以上の発熱なし    肺臓炎:G0</li> <li>・ 気管支出血G0    その他の出血G1以下</li> <li>・ 尿蛋白尿以下</li> <li>・ 収縮期血圧150以下かつ拡張期血圧100以下 (内服治療下で)</li> <li>・ その他 : G2以下</li> </ul>	

ベバシズマブ休薬・再開基準	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出血 G2以上 (気管支出血: G1以上) (気管支はG0で再開、その他はG1で再開)</li> <li>2. 蛋白尿 G3以上 (<math>\geq 300\text{mg/dl}</math>)</li> <li>3. 血圧治療をしても・収縮期血圧150以上、 拡張期血圧100以上 <math>\Rightarrow</math> 下回れば再開</li> </ol>	
ベバシズマブ中止基準	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. G2以上の血栓・塞栓症</li> <li>2. G3以上の出血</li> <li>3. 消化管穿孔</li> <li>4. G3以上の心毒性</li> </ol>	
試験中止	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ G2の肺臓炎</li> <li>・ G4の非血液学的毒性</li> </ul>	

Day 1	
1) 生理食塩液	50mL 血管確保
↓	
2) 生食食塩水	100mL
ベバシズマブ	750mg 30分
↓	
3) 生理食塩液	50mL フラッシュ