


# アミロイドPET検査を 受けられる方へ



## 当日持参していただくもの

### 当院の方

当院診察券、マイナンバーカード(健康保険証)、各種医療証など(お持ちの方のみ)

### 他医療機関からの紹介の方

当院診察券(お持ちの方のみ)、マイナンバーカード(健康保険証)、紹介医からの診療情報提供書、同意書、問診票

★このパンフレットは当日持参願います。

## 料金について

### 保険診療の場合

- 3割負担の方 約7.5万円
- 1割負担の方 約2.5万円

### 保険診療外の場合

- 約25万円(税込)
- ※紹介の方は、初診料・診療情報提供料が含まれます。

ご予約・お問い合わせは

TEL 0766-21-3930 (代)

内線 4415 (呉西PETセンター) 代表番号におかけいただき、内線番号をお伝えください

FAX 0766-24-9509

<https://www.kouseiren-ta.or.jp>

富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院  
富山県高岡市永楽町5番10号 厚生連高岡病院内



厚生連高岡病院  
呉西PETセンター

受付から検査終了まで約3時間です。


様の検査日 年 月 日 ( )

---

来院時間 午前 ・ 午後 時 分

## アミロイドPETはどのような検査ですか？

アルツハイマー病の原因物質と考えられているアミロイドベータ(Aβ)プラークが脳に蓄積しているか、頭部の画像を撮影して調べる検査です。Aβプラークの蓄積はアルツハイマー病の臨床症状が現れる10~20年以上前から始まっています。



## どうしてAβプラークの蓄積を確認するのですか？

認知症にはアルツハイマー病のほかにも様々な原因があり、治療も異なるため、正確な診断をすることは大変重要です。このため、アルツハイマー病によるAβプラークの蓄積を確認してから、Aβプラークを取り除くための治療を行うことがとても重要です。

## 検査はどのように行いますか？


F-18フルテメタモルという薬を静脈注射します。60分間の待機時間のあとに、約20分間の頭部の撮影を行います。待機時間が長いので受診から約3時間で帰宅が可能となります。

## 被ばくについて教えてください

アミロイドPETによる被ばく線量は約4.8~8.1 mSv(ミリシーベルト)です。がんの死亡リスクに影響する線量は、100mSv以上といわれています。体内に投与された薬の半減期(濃度が半分になるまでの時間)は、約110分と短く、約2時間ごとに体内で半分、さらに半分となり、急速に減少していきます。

## そのほかに気を付けることはありますか？

パンフレットを見て検査の予約日時を確認してください。  
 検査が受けられなくなったときは、すみやかに病院まで連絡してください。連絡先はパンフレット裏面に記載されています。  
 検査前の食事制限はありません。お薬もいつもと同様に内服してください。  
 おひとりでトイレを使用できない方は、ご家族の付き添いをお願いします。  
 薬剤によりアナフィラキシーを起こすことがまれにあります。体調に変化が生じたらお知らせ下さい。  
 検査後の当日は人の多いところには立ち寄りしないでください。  
 妊娠中、あるいは妊娠の可能性のある方の検査は避けてください。

- 1 **受付** 当院の方：再来受付機(1階) → 画像診断部受付(1階) → PET検査室(地下1階)へ  
紹介の方：総合受付窓口(1階) → 放射線科受付(1階) → PET検査室(地下1階)へ
- 2 **問診・検査説明** 問診票・同意書の確認をしながら必要事項をうかがいます。身長・体重・血圧を測定します。
- 3 **検査薬注射** 静脈注射を行います。
- 4 **待機(60分)** 撮影の時間まで、リラックスしてお待ちください。
- 5 **排尿** 撮影前に必ず排尿してください。男性も着座をお願いします。
- 6 **撮影** 約20分、寝ているだけですが、動かないようにしてください。
- 7 **終了** 結果説明は後日、主治医にお聞きください。
- 8 **会計** 請求書をお渡しします。支払は、1階正面にある診療費支払機をご利用ください。

## 注意事項

- 検査前後** ● 検査前後での食事や服薬の制限は不要です。
- 検査後** ● 検査後も体内から微量の放射線が放出されていますので、周囲への被ばく防止のため、検査当日中は人混みなどへの外出を控えてください。  
※放射線は、1日(24時間)でほとんど体内からなくなります。
- 授乳中の方は、検査終了の24時間後から授乳可能です。  
※検査前に搾乳したものを本人以外が飲ませるのは問題ありません。
- 乳幼児とのスキンシップは、検査終了の8時間後から可能です。
- その他** ● 問診やトイレに介助が必要な場合は、家族の付き添いをお願いします。
- 検査を受けられない場合は、必ず連絡してください。  
※薬剤が高価なため、キャンセル料が発生することがあります。  
※連絡は前日の14時までをお願いします。

